

Merano

Zetmeelaardappelras met een hoog onderwater gewicht

Voorbehandeling

- Weinig kiemlustig
- Constante koele temperatuur tijdens de pootgoedbewaring (3 °C)
- Zorgen dat de ogen goed “los” zijn tijdens het poten

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift zandgrond: 170 kg N/ha en dalgrond 150 kg N/ha

Poten, plantverband

- Normaal aantal stengels en knollen per plant
- Normale pootafstand toepassen

Groeikenmerken

- Normale opkomst
- Normale knolzetting met een gemiddeld aantal knollen per plant
- In begin fijn loof, later goed dekkend
- Normale bloei met witte bloemen
- Regelmatige sortering
- Weinig gevoelig voor Sencor
- Late rijping (2,5)

Ziekten en plagen

AM-resistentie	: Ro1,4	9	Ro2,3	9	Pa2	9	Pa3	9
AM-tolerantie	: zwak tolerant							
Wratziekte	: fysio1	9	fysio 2/6	9	fysio 18	9	fysio 8	9
Virus	: Y	7	X	8	bladrol			
Phytophthora	: knol	7	loof	7,5				
Schurft	: weinig vatbaar	7						

Oogst en bewaring

- Vroeg in het seizoen slecht rooibaar
- Knollen moeten voldoende zijn afgehard tijdens het rooien. Merano velt snel

Opbrengst proefvelden Averis

	Opbrengsten Nederland/Weser Ems				
	Valthermond	1e Exloërmond	Exloo	Neusustrum	Gemiddeld NL/WE
Jaar	10	10	10	10	
Owg	514	477	494	501	496
Opbr	95	99	96	98	97
Owg	104	102	102	105	103
Ubg	100	102	99	105	102

Pootgoedteelt

- Ruim aantal ronde knollen. Merano groeit niet snel te grof
- Y-viruszieke planten zijn moeilijk te herkennen.
- Stikstofgift beperken
- Heeft een goede pootgoedopbrengst

Teeltgebied

- Door zijn brede ziekte resistenties geschikt voor Nederland en het Weser Ems gebied