

## Merenco

Späte Stärkesorte mit einem sehr hohen Stärkegehalt der auch einfach früh zu Rodern ist. Wachst gut unter trockenen Bedingungen

### Vorbehandlung

- Sehr schnelle Keimung
- Während der Lagerung der Pflanzkartoffeln ist eine kühle Temperatur erforderlich

### Düngung

- Richtlinie Stickstoffgabe Sand 180 kg N/ha und Moor 140 kg N/ha
- Stickstoff sofort geben. Nicht teilen.

### Wuchseigenschaften

- Schnelles auflaufen und schnelles deckendes Kraut
- Viele Stängel pro Pflanze
- Normale Anzahl runder Knollen
- Flache Augen
- Gelbe Knollenfarbe
- Hoch aufrechte, robuste Pflanzen mit rosa Blüten
- Anwendung Sencor vor auflaufen verursacht keine Probleme
- Empfindlich gegen Durchwuchs
- Sehr späte adreife (2.5)

### Krankheiten und Resistenzen

<b>Nematodenresistenz</b>	: Ro1	<b>9</b>	Ro 2,3	<b>9</b>	Pa2	<b>9</b>	Pa3	<b>9</b>
<b>Nematodentoleranz</b>	:	<b>8</b>						
<b>Kartoffelkrebs</b>	: fysio 1	<b>R</b>	fysio 2/6	<b>9</b>	fysio 18	<b>7</b>	fysio 8	<b>9</b>
<b>Phytophthora</b>	: loof	<b>7,0</b>	knol	<b>8</b>				
<b>Virus</b>	: Y	<b>7</b>						
<b>Schorf</b>	: mittelmäßig empfindlich			<b>6</b>				

### Ertrag Versuchsfelder Niederlande/Weser Ems

	Valthermond	1e Exloermond	Exloo	Neusustrum	Durchschnitt
<b>Jahr</b>	7	7	7	7	
<b>Stärkegehalt</b>	557	540	542	544	544
<b>Knollenertrag</b>	96	102	105	102	101
<b>Stärke in %</b>	23,6	22,7	22,8	22,9	22,9
<b>Stärkeertrag</b>	110	114	116	111	113

### Lagerung

- Nicht geeignet für längere Lagerung. Lagerung vorzugsweise von Ende September bis Dezember
- Da Merenco "in das Grüne Kraut" gut zu Rodern ist, liefern Sie so schnell wie möglich die Kartoffeln, um Lagerverluste zu vermeiden

### Pflanzguterzeugung

- Durchschnittliche Pflanzkartoffelertrag
- Frühe Knollenbildung
- Wächst schnell zu grob
- Wenig Schorf empfindlich
- Y-virus empfindlich, Virus ist bei Selektion gut zu sehen

### Anbaugebiet

- Niederlande und das Weser Ems Gebiet