

# Amarock

Stärkekartoffelsorte, die aufgrund unzureichender Pflanzguteigenschaften nicht weiter vermehrt wird

## Vorbehandlung

- Wenig keimfreudig

## Düngung

- Richtlinie Stickstoffgabe Moorboden **150** kg N/ha und Sandboden **180** kg N/ha

## Wuchseigenschaften

- Langsames Auflaufen
- Frühe Knollenansatz
- Durchschnittliche Augentiefe und eine hellgelbe Fleischfarbe
- Große rundovale Knollen
- Blüht mit weißen Blüten
- Etwas empfindlich gegenüber Sencor
- Mittelspäte Abreife (4)

## Krankheiten und Resistenzen

Nematodenresistenz	: Ro1	<b>9</b>	Ro2,3	<b>9</b>	Pa2	<b>9</b>	Pa3	<b>8</b>
Nematodentoleranz	:	<b>7</b>						
Kartoffelkrebs	: fysio 2/6	<b>10</b>	fysio 18	<b>9</b>				
Phytophthora	: Kraut	<b>6</b>	Knolle	<b>7</b>				
Virus	: Y	<b>6</b>						
Schorf	: mittelmäßig anfällig			<b>6</b>				

## Ertrag Versuchsfelder Niederlande/Weser Ems

	Moorboden	Sandboden	Durchschnitt
Jahr	7	7	
Knollenertrag	114	110	112
Stärke in %	19,3 %	18,9 %	19,1 %
Stärkeertrag	110	104	107

## Lagerung

- Rechtzeitig Kraut töten und spät ernten, Knollen trennen sich nicht einfach von Kraut
- Gut zu Lagern

## Pflanzguterzeugung

- Unter durchschnittliche Pflanzgutertrag
- Wächst grob mit wenig Stuckzahl
- Anfällig für Y Virus
- Etwas Schorf empfindlich

## Anbauggebiete

- Die Niederlande und das Weser-Ems-Gebiet