



Robuste und ertragreiche Stärkekartoffelsorte mit breiter Nematoden-, Schorf- und Virusresistenz

Vorbehandlung

- Etwas keimfreudig
- Pflanzgut nicht stark vorkeimen lassen! Adelinde ist überdurchschnittlich empfindlich gegenüber Vorkeimung
- Pflanzgut trocken in mechanischer Kühlung lagern
- Nach Lagerung in mechanischer Kühlung kann ein Wärmeschub erforderlich sein

Düngung

- Richtwert Stickstoffgabe: **150 kg N/ha**. Auf leichtem Sandboden sind auch **180 kg N/ha** unproblematisch, auf schwereren Böden reichen 125 kg N/ha aus

Pflanzung

- Zählen Sie bei 100 Knollen die Anzahl der Keime. Im Durchschnitt bildet jeder Keim einen Stängel. Die Pflanzabstände sollten auf 15 Stängel pro Meter Reihe basieren
- Früh pflanzen, da aufgrund der späten Abreife eine maximale Anzahl an Wachstumstagen benötigt wird

Wachstumsmerkmale

- Sehr zügiger Auflauf
- Normale Knollenanzahl mit gleichmäßiger Knollengröße
- Weiß-gelbes Fleisch
- Flachrunde bis ovale Knollen
- Blüht mit blau/violetten Blüten
- Weniger Laub als andere Stärkekartoffelsorten
- Gleichmäßiger Pflanzenbestand mit dunkelgrünem Laub
- Wenig empfindlich gegenüber Sencor
- Späte Abreife (3,5)

Ernte und Lagerung

- Besondere Aufmerksamkeit bei der Bekämpfung von Phytophthora. Vergleichbar mit BMC
- Achten Sie darauf, dass die Kartoffeln bei der Ernte gut abgehärtet sind
- Geeignet für Kurzzeitlagerung im Mietenlager
- Mäßig lagerfähig in der Halle. Besondere Aufmerksamkeit beim Trocknen während und nach der Einlagerung verbessert die Lagerfähigkeit von Adelinde deutlich

Krankheiten und Schädlinge

Nematodenresistenz	Ro 1	9	Ro 2,3	9	Pa 2	9	Pa 3	9
Nematodentoleranz		8						
Kartoffelkrebs	Fysio 1	9	Fysio 2/6	10	Fysio 18	9		
Phytophthora	Laub	5,5	Knolle	6				
Virus	Y	9						
Schorf			mittelanfällig	6				

Erträge Versuchsfelder Niederlande/Weser-Ems

	Lehmboden	Sandboden	Durchschnitt
Ertrag	112	113	112
Uwg	496 Gramm	477 Gramm	487 Gramm
Stärke %	20,4 %	20,5%	20,5%
Stärkeertrag	110	111	110

Planzguterzeugung

- Gute Pflanzguterträge
- Virus-Y-resistent, Ölspritzung nicht erforderlich
- Krautabtötung gut möglich durch aufrechte Blätter
- Besondere Aufmerksamkeit zur Vermeidung von Phytophthora

Anbauggebiete

- Niederlande und Weser-Ems-Gebiet