



Mittelspäte Stärkesorte mit hohem Stärkegehalt und guter Lagerfähigkeit. Besonders geeignet für bessere Böden.

Vorbehandlung

- Normale Keimruhe
- Konstant kühle Temperatur während der Pflanzgutlagerung

Düngung

- Richtwert Stickstoffgabe: Sandboden **210 kg N/ha**, Leimboden **180 kg N/ha**
- Stickstoffgabe nicht aufteilen

Pflanzung

- Nicht zu schnell pflanzen (max. 5 km/h), um einen gleichmäßigen Pflanzabstand zu gewährleisten

Wachstumsmerkmale

- Normales Auflaufen und gleichmäßige Anfangsentwicklung
- Viele runde Knollen
- Viel kleines/kneifendes Laub – typisch für diese Sorte
- Flache Augen, weißgelbes Fleisch
- Gut deckendes, hoch aufwachsendes, standfestes Kraut mit weißen Blüten
- Empfindlich gegenüber Sencor – Anwendung vor dem Auflaufen verursacht keine Probleme
- Mittelspäte Reife (4)

Krankheiten und Schädlinge

Nematodenresistenz	Ro 1	9	Ro 2,3	9	Pa 2	9	Pa 3	9
Nematodentoleranz		7,5						
Kartoffelkrebs	Fysio 1	9	Fysio 2/6	9	Fysio 18	9	Fysio 8	9
Phytophthora	Laub	5,5	Knolle	5,5				
Virus	Y	9						
Schorf				6				

Erträge Versuchsfelder Niederlande/Weser-Ems

	Lehmboden	Sandboden	Durchschnitt
Jahr	10	10	
Ertrag	96	91	94
Stärke %	22,8 %	22,9 %	22,9 %
Stärkeertrag	106	101	103

Ernte und Lagerung

- BMC ist früh gut rodefähig
- BMC ist gut lagerfähig
- Bei der Lagerung besonders auf Knollen-Phytophthora achten

Planzguterzeugung

- Guter Pflanzgutertrag
- Viele Knollen, die nicht schnell zu grob werden
- Etwas schorfanfällig
- Sehr gute Y-Virus-Resistenz

Anbaugesbiet

- Niederlande und Weser-Ems-Gebiet
- Geeignet für Stärke, Granulate und Flocken