



Ertragreiche, lagerfähige Stärkekartoffelsorte

Vorbehandlung

- Durchschnittliche Keimruhe
- Aus verschiedenen Pflanzgut-Vorbehandlungsversuchen ergibt sich keine eindeutige Empfehlung

Düngung

- Richtwert Stickstoffgabe: Leimboden 180 kg N/ha, Sandboden **180 kg N/ha**
- Stickstoffgabe auf einmal ausbringen – nicht aufteilen!

Pflanzung

- Zählen Sie bei 100 Knollen die Anzahl der Keime. Im Durchschnitt bildet jeder Keim einen Stängel. Berechnen Sie den Pflanzabstand auf Basis von 15 Stängeln pro laufendem Meter
- Hermans bildet mehr Stängel und Knollen als der Durchschnitt

Wachstumsmerkmale

- Normales, gleichmäßiges Auflaufen
- Normales Laubverhalten
- Frühreif
- Hohe Knollenzahl mit durchschnittlicher Knollenansatzrate
- Normale Blüte mit wenigen rot-violetten Blüten
- Späte Abreife (Reifegruppe 3,5)

Lagerung

- Nur für späte Lieferung geeignet
- Hermans zeigt gute Lagerergebnisse
- Löst sich leicht vom Laub und ist gut rodefähig
- Bei größeren Knollen kann es gelegentlich zu innerer Verfärbung kommen

Krankheiten und Schädlinge

Nematodenresistenz	Ro 1,4	9	Ro 2,3	9	Pa 2	9	Pa 3	9
Kartoffelkrebs	Fysio 1	6	Fysio 2/6	8	Fysio 18	8	Fysio 8	9
Phytophthora	Laub	7	Knolle	8				
Virus	Y	9	X	7,5				
Schorf	mäßig anfällig			7				

Erträge Versuchsfelder Niederlande/Weser-Ems

	Lehmboden	Sandboden	Durchschnitt
Ertrag	108	105	107
Uwg	492 Gramm	493 Gramm	492 Gramm
Stärke %	21,1 %	21,2 %	21,1 %
Stärkeertrag	109	108	109

Planzguterzeugung

- Überdurchschnittlicher Pflanzgutertrag mit gleichmäßiger Anzahl runder Knollen
- Der Einsatz von Mineralöl ist nicht erforderlich
- Besondere Aufmerksamkeit zur Vermeidung von Blattrollkrankheit
- Wenig Probleme mit Mutterknollen bei der Ernte

Anbaugesbiet

- Niederlande und das Weser-Ems-Gebiet