



Früheste Stärkesorte, geeignet für die Frühlieferung, mit sehr hoher Resistenz gegen die bekanntesten Bodenkrankheiten

Vorbehandlung

- Schnelle Keimung
- Vorkeimen ist daher nicht notwendig

Düngung

- Düngung wie bei einer Frühlieferung. Richtwert Stickstoffgabe: Sandboden: **150 kg N/ha**, Lehmboden: **150 kg N/ha**
- Bei Lieferung in der Hauptkampagne: Ende Juni zusätzlich 50 kg N nachdüngen

Pflanzung

- Nicht zu schnell pflanzen (max. 5 km/h), um einen gleichmäßigen Pflanzabstand zu gewährleisten

Wachstumsmerkmale

- Schneller Auflauf und rasche, gute Bodenbedeckung
- Sehr frühe Knollenbildung
- Flache Augen, hellgelbe Fleischfarbe
- Große Knollen
- Weiße Blüten
- Etwas empfindlich gegenüber Sencor. Anwendung vor dem Auflaufen verursacht keine Probleme
- Sehr frühe Reifezeit (6)

Ernte und Lagerung

- Vermont ist eine Sorte speziell für die Frühvermarktung. Für Lieferungen ab Mitte September und später sind ertragreichere Sorten besser geeignet
- Früh sehr gut rodefähig

Krankheiten und Schädlinge

Nematodenresistenz	Ro 1	9	Ro 2,3	9	Pa 2	9	Pa 3	9
Nematodentoleranz		8						
Kartoffelkrebs	Fysio 1	R	Fysio 2/6	10	Fysio 18	10	Fysio 8	8
Phytophthora	Laub	7	Knolle	8				
Virus	Y	6						
Schorf	wenig anfällig			7				

Erträge Versuchsfelder Niederlande/Weser-Ems

	Lehmboden	Sandboden	Durchschnitt
Jahr	6	6	
Ertrag	99	96	97
Stärke %	20,3 %	20,7 %	20,5 %
Stärkeertrag	96	99	97

Planzguterzeugung

- Gute Pflanzguterträge
- Sehr frühe Knollenbildung
- Gleichmäßige Sortierung
- Wenig anfällig für Schorf
- Empfindlich gegenüber dem Y-Virus, Virus ist bei der Selektion gut sichtbar
- Empfindlich gegenüber Ernteschäden (zusätzliche Kaliumdüngung empfohlen)

Anbaugesbiet

- Niederlande und das Weser-Ems-Gebiet