Avenger

Reifezeit
3,5

Averis
for tomorrow's harvest

Stärkesorte mit breiter Resistenz gegen Nematoden, verbesserter Phytophthora-Resistenz und guter Hitzetoleranz

Vorbehandlung

- Nicht unter 5 °C lagern, vorzugsweise nicht in mechanischer Kühlung
- Sortieren, sobald sich die Augen lösen
- Avenger muss vor dem Pflanzen aufgewärmt werden, um einen zügigen Auflauf zu gewährleisten
- Früh pflanzen, aber nicht in kalte, nasse Böden – Avenger benötigt viele Wachstumstage

Düngung

- Richtwert Stickstoffgabe: Lehmboden: **140–150 kg** N/ha, Sandboden: **140–150 kg** N/ha

Wachstumsmerkmale

- Langsamer, teils unregelmäßiger Auflauf
- Wenig keimfreudig, späte Knollenbildung
- Weiß-gelbes Fleisch, große, flach rundovale Knollen
- Avenger ist hitzetolerant
- Anfangs feines, leicht schlaffes Laub, gute Bodenbedeckung
- Blüht mit lila Blüten, die später im Saisonverlauf weiß werden
- Wenig empfindlich gegenüber Senco, späte Reife (Reifegruppe 3)

Ernte und Lagerung

- Etwas anfällig für Hohlherzigkeit, nicht für Hallenlagerung geeignet
- Geeignet für die direkte Lieferung im Oktober und November
- Maximal 2 Wochen in Mieten lagern
- Der Tara-Anteil von Avenger ist etwas höher

03_2025_Avenger_V01

Krankheiten und Schädlinge

Nematodenresistenz	Ro 1	**9**	Ro 2,3	**9**	Pa 2	**9**	Pa 3	**9**
Nematodentoleranz		**7**						
Kartoffelkrebs	Fysio 1	**10**	Fysio 2/6	**10**	Fysio 18	**10**		
Phytophthora	Laub	**9**	Knolle	**9,5**				
Virus	Y	**6**						
Schorf	mäßig anfällig							

Erträge Versuchsfelder Niederlande/Weser-Ems

	Lehmboden	Sandboden	Durchschnitt
Ertrag	104	114	109
Uwg	517 gram	473 gram	494 gram
Stärke %	21,5 %	19,2 %	20,3 %
Stärkeertrag	109	109	109

Planzguterzeugung

- Normale Y-Virus-Resistenz, daher ist der Einsatz von Öl zur Begrenzung der Virusübertragung empfohlen
- Virusinfizierte Pflanzen sind schwer zu erkennen
- Aufgrund der guten Keimruhe ist eine Lagerung in mechanischer Kühlung nicht erforderlich und sogar nicht empfehlenswert

Anbaugebiet

- Niederlande und das Weser-Ems-Gebiet

Phytophthora-Bekämpfung

Avenger verfügt über eine verbesserte Resistenz gegen Phytophthora infestans. Diese Resistenz wurde über mehrere Jahre hinweg in der Praxis erprobt. Dabei hat sich gezeigt, dass – abhängig vom lokalen Phytophthora-Druck – deutlich weniger gespritzt werden muss, um den Bestand frei von Phytophthora zu halten. (Denke daran: auch Blattläuse und Alternaria müssen bekämpft werden!) Der Spritzzeitpunkt richtet sich nach den praktischen Erfahrungen und dem Phytophthora-Warnsystem von Dacom | CropX. Die Spritzzeitpunkte werden von Avebe-Agro festgelegt und müssen dann auch konsequent eingehalten werden.
Wichtig: Es darf keine Phytophthora im Bestand auftreten, um eine Resistenzdurchbrechung zu vermeiden!

Averis | Postfach 15 | 9640 AA Veendam | Niederlande | Tel.: +31 598 66 50 52 | E-mail: info@averis.nl | www.averis.nl