



Robuust zetmeelaardappelras vol potentie

Voorbehandeling

- Kiemlustig
- Pootgoed niet zwaar afkiemen! Adelinde is bovengemiddeld gevoelig voor afkiemen
- Bewaar pootgoed droog in de mechanische koeling
- Na bewaring in mechanische koeling kan een warmte stoot nodig zijn

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift **150 kg N/ha**. Op een schrale zandgrond is **180 kg N/ha** ook geen probleem, echter voor de zwaardere gronden is een gift van **125 kg N/ha** voldoende

Poten

- Tel van 100 knollen het aantal kiemen. Gemiddeld vormt iedere kiem een stengel. Baseer de plantafstand op 15 stengels per meter rij
- Vroeg poten, door late afrijping maximaal aantal groeidagen nodig

Groeikenmerken

- Zeer vlotte opkomst
- Normale knolzetting en een regelmatige partij knollen
- Wit gele vleeskleur
- Platrond-ovale-knollen
- Bloeit met blauw / paarse bloemen
- Minder loof dan andere zetmeelaardappelrassen
- Regelmatig gewas met donker groen loof
- Late afrijping (3)

Oogst en bewaring

- Extra aandacht voor Phytophthora bestrijding. Vergelijkbaar met BMC
- Zorg dat de aardappelen goed zijn afgehard tijdens het rooien
- Geschikt voor korte bewaring in de kuil
- Matig bewaarbaar in de schuur. Extra aandacht voor het drogen tijdens en na het inschuren maakt Adelinde goed bewaarbaar

Ziekten en plagen

AM resistentie	Ro 1	9	Ro 2,3	9	Ro 5	8	Pa 2	9	Pa 3	9
AM-tolerantie		8								
Wratziekte	fysio 1	9	fysio 2/6	10	fysio 18	9				
Phytophthora	loof	5,5								
Virus	Y	9								
Schurft	middelmatig vatbaar		6							

Opbrengst proefvelden Nederland/Weser Ems

	dalgrond	zandgrond	gemiddeld
Opbrengst	112	114	113
Owg	490 gram	476 gram	483 gram
Zetmeel %	20,1 %	19,3 %	19,7 %
Zetmeel opbrengst	109	111	111

Pootgoedteelt

- Goede pootgoed opbrengst
- Y-virus resistent, spuiten met olie is niet nodig
- Loof trekken goed mogelijk door stijl, rechtopstaand loof
- Extra aandacht om Phytophthora te voorkomen

Teeltgebied

- Nederland en het Weser Ems gebied