



Veelzijdig met hoge zetmeelopbrengst

Voorbehandeling

- Gemiddelde kiemrust
- Uit de verschillende pootgoedvoorbehandelingsproeven blijkt geen voorkeur

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift dal **180 kg N/ha** en zand **180 kg N/ha**. Stikstofgift in een keer geven; niet delen!

Poten

- Tel van 100 knollen het aantal kiemen. Gemiddeld vormt iedere kiem een stengel. Baseer de plantafstand op 15 stengels per meter rij
- Hermans geeft meer stengels en knollen dan gemiddeld

Groeikenmerken

- Normale, regelmatige opkomst
- Normaal looftype
- Ruim aantal knollen met een gemiddelde knolzetting
- Normale bloei met weinig rood-paarse bloemen
- Afrijping (4)

Bewaring

- Alleen geschikt voor latere levering
- Bewaarresultaten van Hermans zijn goed
- Hermans laat makkelijk los van het loof en is goed rooibaar
- Hermans geeft soms interne knolverkleuring bij met name de grotere knollen

Ziekten en plagen

AM resistentie	Ro 1,4	9	Ro 2,3	9	Ro 5	8	Pa 2	9	Pa 3	9
Wratziekte	fysio 1	6	fysio 2/6	9	fysio 18	8				
Phytophthora	loof	7,5								
Virus	Y	9								
Schurft	weinig vatbaar		7							

Opbrengst proefvelden Nederland/Weser Ems

	dalgrond	zandgrond	gemiddeld
Opbrengst	105	107	105
Owg	504 gram	523 gram	511 gram
Zetmeel %	20,8 %	21,8 %	21,2 %
Zetmeel opbrengst	106	108	106

Pootgoedteelt

- Bovengemiddelde pootgoedopbrengst met een regelmatig aantal ronde knollen
- Minerale olie toepassen is niet nodig
- Extra aandacht voor het voorkomen van bladrol
- Weinig last van moederknollen bij de oogst

Teeltgebied

- Nederland en het Weser Ems gebied